

## COVID-19 i consum de drogues

La directora de l'Institut Nacional sobre Abús de Drogues dels Estats Units (NIDA), Nora Volkow, va publicar al març un document sobre [COVID-19: Las posibles implicaciones para las personas con trastornos por consumo de drogas](#).

Segons aquest, la COVID-19 podria afectar més els fumadors de tabac, marihuana, consumidors de cigarrets electrònics, així com, els consumidors d'opiacis i metamfetamines.

En els consumidors de cigarrets electrònics i els fumadors de tabac i cànnabis el mal es produeix per les conseqüències lesives que ocasiona aquest consum en les cèl·lules pulmonars i per la menor capacitat de resposta davant les infeccions.



En els consumidors d'opiacis, pot existir una possible reducció del ritme respiratori i en els consumidors de metamfetamines una contracció dels vasos sanguinis i la possibilitat de generar hipertensió pulmonar.

Per això, els consumidors d'aquestes substàncies haurien de ser conscients de la necessitat imperiosa d'acudir a tractament pel seu trastorn addictiu, perquè no sols pot millorar la seua qualitat de vida sinó també disminuir les conseqüències davant una possible infecció pel coronavirus.

A més, cal tindre en consideració que si aquesta població consumidora de substància s'infecta pel coronavirus pot estar patint una doble estigmatització per part de la societat, tant pel consum de substàncies com pel risc de transmissió de la COVID-19.

Els professionals han d'estar atents a aquesta situació i posar a la disposició dels pacients tots els recursos sanitaris i socials disponibles que milloren els seus trastorns addictius, les conseqüències psicològiques derivades del contagi i de l'addicció i millorar, en la manera del possible, la seua salut física i mental.